

BULLETIN N°3

AOÛT 2026

CADRE NATIONAL POUR LES SERVICES CLIMATIQUES CLIMAT - AGRICULTURE & SÉCURITÉ ALIMENTAIRE



EVOLUTION DE LA CAMPAGNE AGRO-PASTORALE AU 31 AOÛT 2026

SOMMAIRE

- Données climatiques
- Données agricoles : situation phénologique
- Situation phytosanitaire
- Situation acridienne
- Situation pastorale
- Mise en valeur des Aménagements Hydro-Agricoles (AHA)
- Évolution des prix sur les marchés
- Synthèse
- Perspectives
- Avis et Conseil



I. DONNÉES CLIMATIQUES

1.1 CUMUL SAISONNIER AU 31 AOÛT 2026

Le mois de août 2026 a été marqué par des pluies faibles à modérées voire très fortes par endroits. Le cumul pluviométrique mensuel a varié entre 19 mm (Mainé soroa) et 283,5 mm (Madarounfa) au niveau des localités arrosées.

Par ailleurs, des hauteurs de pluie supérieures à 60 mm en un jour ont été relevées sur plusieurs postes pluviométriques. Il s'agit notamment des régions de Tillabéri (Abala, Zokoti, Garantché), de Dosso (Téguézé Koirra, Birni N'Falla, Douméga), de Tahoua (Dibissou), de Zinder (Koleram, Gouna, Diney, Gada), de Maradi (Dan Tourké, Tessaoua, Bougouzawa, Fako, Dagouagé, Jigawa, Milli, Mado) ainsi que de Diffa (N'Guel Kolo). Ainsi, le maximum journalier a été enregistré dans la région de Maradi (Mado) avec une hauteur de 104 mm de pluie. De même, le poste pluviométrique de N'Guel Kolo, dans la région de Diffa, a enregistré 92 mm en une seule journée (figure 1).




Figure 1: Cumul pluviométrique saisonnier au 31 août 2026

Le cumul pluviométrique saisonnier au 31 août 2026, comparé à celui 2026 l'année passée à la même période (fig.2) est globalement déficitaire sur la bande agropastorale. Néanmoins, des poches d'excédents pluviométriques sont observées sur les localités de la région de Zinder (Dungass), de Maradi (Guidan Roumji), de Tahoua (Birni N'konni, Tahoua, Illéla), de Tillabéri (Say, Tillabéri, Filingué, Téra, Ouallam).




Figure 2: Cumul saisonnier au 31 août comparé à celui de l'année passée

Par rapport à la normale 1991-2020, le cumul saisonnier au 31 août 2026 est globalement déficitaire sur toute la bande agropastorale (fig.3).




Figure 3: Cumul pluviométrique saisonnier au 31 août comparé à la normale 1991-2020

1.2. SITUATION AGRO MÉTÉOROLOGIQUE

• ANOMALIE DE L'INDICE DE VÉGÉTATION NORMALISÉ

L'anomalie de l'indice de végétation normalisé (NDVI) pour le mois d'août 2026, comparée à la normale de 1981-2010 (fig.4), révèle une couverture végétale dense (anomalie positive) dans la majeure partie de la bande agropastorale du pays, indiquant des conditions végétales favorables. Néanmoins, une couverture végétale inférieure à la normale (orange à rouge) est observée à l'extrême Est de Zinder et dans la majeure partie de la région de Diffa où elle est plus prononcée. Cela pourrait s'expliquer par les séquences sèches enregistrées dans cette zone.




Figure 4: Anomalie de l'indice de la végétation normalisé au 31 août 2026

II. SITUATION DE LA CAMPAGNE AGRICOLE AU 31 AOÛT 2026

2.1. SITUATION DES SEMIS

A la date du 30 août 2026, le nombre de villages sur le plan national ayant effectué le semis de mil est de 13 635 sur un total de 14 013 villages agricoles suivis soit un taux de couverture de 97 % contre 99 % sur les 13981 villages agricoles suivis à la même période en 2025. Le nombre de villages sans semis est de 378 répartis comme suit : Agadez (11 villages), Diffa (242 villages), Tillabéri (105 villages) et Zinder (20 villages). Ce retard s'explique principalement par l'installation tardive de la campagne due à l'irrégularité des précipitations et à l'insécurité dans certaines zones .

2.2. SITUATION PHÉNOLOGIQUE

Le stade dominant pour le mil est la nouaison-épiaison avec 28 % et la montaison pour le sorgho avec 39% sur le plan national. Le stade le plus avancé pour le mil est la maturité observée dans les départements de Gaya et Falmey (région de Dosso), Madarounfa, Gazaoua, Mayahi et Tessaoua (région de Maradi), Illéla, Konni, et Tahoua département (région de Tahoua), Dungass, Kantché et Magaria (région de Zinder). Quant au sorgho le stade le plus avancé est la maturité observée dans le département d'Illéla (région de Tahoua). (Fig.5).




Figure 5 : Stades phénologiques (%) de mil et sorgho au 31 août 2026

En ce qui concerne les cultures de rente (niébé et arachide), le stade le plus avancé est la maturité observée dans beaucoup de localités des régions de Maradi, Tahoua et Zinder pour le niébé et les départements de Mayahi (région de Maradi) , Bagaroua et Illéla (région de Tahoua) pour l'arachide.



2.3. SITUATION PHYTOSANITAIRE

La campagne des cultures pluviales 2026 se poursuit activement avec quelques infestations dans les zones où certaines cultures en place ont connu divers stades d'évolution. La situation phytosanitaire ayant prévalu au cours du mois d'août (fig.6) se caractérise par des :

- infestations de sautériaux (*Kraussaria angulifera*, *Diabolo catantops axillaris*, *Oedaleus senegalensis*) sur le mil, le maïs, le sorgho et le niébé aux stades de la levée avancée à la grenaison dans les régions de Diffa (Goudoumaria, Maïné Soroa), Dosso (Dogondoutchi), Agadez (Tchirozérine, Aderbissanat), Tillabéri (Kollo), Tahoua (Abalak, Illéla, Tahoua, Konni, Keita, Tchintabaraden, ville de Tahoua), Zinder (Gouré, Mirriah) et Niamey ;

- infestations d'insectes floricoles (*Dysdercus volkeri*, *Rhyniptia infuscata*, *Pachnoda interrupta*, *Psalydolytta thesae*) sur le mil, le sorgho et le niébé aux stades de la nouaison à la grenaison dans les régions de Dosso (Gaya, Dogondoutchi, Dioundiou, Falmey, Dosso, Tibiri, ville de Dosso), Zinder (Kantché, Takiéta, Mirriah, Gouré, ville de Zinder), Tillabéri (Abala, Ballèyara, Bankilaré, Filingué, Kollo, Ouallam, Say, Téra), Tahoua (Illéla, Bagaroua, Tchintabaraden, Konni, Tahoua, Madaoua, Abalak, ville de Tahoua) et Maradi (Mayahi, Madarounfa, Aguié, Gazaoua, Guidan Roudji) ;

- infestations de la chenille légionnaire d'automne (*Spodoptera frugiperda*) sur le maïs aux stades de la levée avancée à l'épiaison dans les régions de Diffa (Goudoumaria, N'guigmi) et Agadez (Iférouane) ;

- infestations des chenilles (*Amsacta moloneyi*, *Antigastra catalaunalis*, *Noorda blitealis*, *Spodoptera exempta*) sur le niébé, le sésame, le moringa, l'arachide, l'oignon, le mil et le sorgho aux stades de la croissance à la formation des gousses dans les régions de Dosso (Dogondoutchi), Zinder (Takiéta, Kantché, Magaria, Mirriah), Agadez (Tchirozérine), Diffa (Maïné Soroa, N'guigmi), Tahoua (Bouza, Madaoua), Maradi (Tessaoua, ville de Maradi) et Niamey ;

- infestations de pucerons (*Aphis craccivora*) sur le niébé, l'arachide et les cucurbitacées aux stades de la croissance à la fructification dans les régions de Diffa (Maïné Soroa), Tahoua (Madaoua, Malbaza), Maradi (Mayahi, Gazaoua, Tessaoua), Agadez (Ingall, Aderbissanat) et Niamey ;

- infestations de criocères (*Lema planifrons*) sur le mil aux stades de levée avancée, de tallage à la montaison dans les régions de Tahoua (Madaoua), Maradi (Mayahi, Dakoro, Tessaoua, Guidan Roudmji), Zinder (Gouré, Dungass, Damagaram Takaya, Kantché, Takiéta, ville de Zinder) et Diffa (Maïné Soroa, ville de Diffa) ;
- infestations de la cicadelle (*Poophilus costalis*) dans la région de Zinder (Takiéta) ;
- infestations de thrips (*Thrips tabaci*) sur l'oignon au stade de croissance dans la région d'Agadez (Tchirozérine, Iférouane) ;
- infestations de l'acarier rouge (*Tetranychus urtica*) sur le mil, le sorgho et le niébé aux stades de tallage à la montaison dans la région de Niamey ;
- infestations du piqueur-suceur (*Locris rubens*) sur le mil et le sorgho aux stades de tallage à la montaison dans la région de Tahoua ;
- attaques d'oiseaux granivores (*Quelea quelea*, *Passer luteus*) sur le mil au stade grenaison dans les régions de Dosso (Gaya, Falmey, Dogondoutchi), Maradi (Gazaoua, Guidan Roudmji), Tillabéri (Abala, Filingué) et Tahoua (Konni, Illéla, Tahoua, Malbaza, Madaoua, ville de Tahoua) ;
- infestations du foreur de tiges (*Coniesta ignefusalis*) sur le mil au stade montaison dans les régions de Tahoua (Madaoua) et Zinder (Damagaram Takaya) ;
- infestations de la mineuse de l'épi du mil (*Heliocheilus albipunctella*) sur le mil aux stades de floraison à la maturité dans les régions de Zinder (Kantché, Magaria, Dungass), Tahoua (Illéla, Tahoua, Konni), Maradi (Guidan Roudmji, Dakoro, Madarounfa, Gazaoua) et Dosso (Dogondoutchi, Dosso).

Les superficies infestées au cours de ce mois d'août 2026, sont évaluées à 14 470,5 ha dont 11 127,5 ha traités soit un taux de couverture de 76,90%. Ces traitements ont été réalisés avec 9 075,5 litres de pesticides.




Figure 6 : Types de ravageurs en août 2026

Par ailleurs dans le cadre de la lutte biologique contre la chenille mineuse de l'épi du mil , l'élevage de *Corcyra cephalonica* indispensable à la production en masse d'*Habrobracon hebetor* se poursuit normalement au niveau du laboratoire de la Direction Générale de la Protection des Végétaux (DGPV). Les opérations de lâcher sont en cours dans les localités des régions de Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua et Zinder.

2.4. SITUATION ACRIDIENNE

Au cours du mois d'août 2026, des précipitations ont été enregistrées dans la majorité des principales aires de reproduction estivale et de grégarisation du criquet pèlerin.

Les températures (diurnes comprises entre 39 et 42 °C et nocturnes de 26 à 28 °C) et les vents (1 à 3m/s) ont favorisé le maintien de conditions écologiques propices au développement du criquet.

La végétation s'est bien développée, assurant une disponibilité suffisante des ressources alimentaires. Ces conditions pourraient favoriser des regroupements localisés dans certains habitats favorables.

Une mission de prospection a été réalisée dans le Tamesna, où des individus isolés matures ont été observés.

Malgré ces conditions favorables, la situation acridienne demeure calme au cours de ce mois.

2.5. SITUATION PASTORALE

La situation pastorale en fin août 2026 est caractérisée par la poursuite du développement végétatif des herbacées et des ligneux. Le stade phénologique des herbacées varie d'une zone à une autre. Ainsi, dans la bande Sud du pays, le stade dominant varie de la montaison à l'épiaison chez les graminées et de la floraison à la formation des gousses chez les légumineuses. Au niveau de la majeure partie de la zone pastorale, il varie de la levée à la levée avancée voire le tallage pour les graminées et de la levée chez les légumineuses (fig.7 & 8).



Figure 7 & 8 : Etat des pâturages respectivement à Akadaney (Bermo) et Toudoun Agoua (Takieta).

Malgré ce développement végétatif, des signes de stress hydrique entraînant le flétrissement voire le dessèchement du tapis herbacé ont été observés dans la majeure partie de la zone pastorale (fig.9 & 10).



Figure 9 : Etat des pâturages à N'Guel Daoudji



Figure 10: Etat des pâturages de la zone de Jouti (Berma)

Il faut aussi signaler que, la situation pastorale est plus critique dans les zones non encore arrosées ou faiblement arrosées présentant des sols complètement nus (fig.10 & 11)



Figure 11: Situation des parcours d'Aminata (Berma)



Figure 12 : Situation des parcours à Echker Tagaza (Est d'Aderbissanat)

Plusieurs aires de pâturages des régions de Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéri et Zinder, sont colonisées par des espèces peu ou pas appréciées par les animaux comme le *Sida cordifolia*.

L'état d'embonpoint des animaux est bon dans son ensemble (fig.12). Le terme de l'échange est en faveur des éleveurs avec quelques disparités inter et intrarégionales (fig.13).



Figure 12 : Présentation des animaux au marché de Boulthoum /Gouré




Figure 13 : TDE par région troisième décade d'août 2026

L'abreuvement des animaux s'effectue sans grande difficulté au niveau des points d'eau de surface dans les zones ayant enregistré des pluies (fig.14 & 15).



Figure 14 et 15 : Abreuvement des animaux au niveau des mares d'Aderbissinat et d'Ingall

Au cours de ce mois, il a été enregistré plusieurs mortalités d'animaux suite aux cas de foudre et de noyade. Des cas d'invasion de criquets sur le pâturage ont aussi été enregistrés. Ces situations se présentent comme suit :

- La mortalité de 15 bovins, 1 chèvre et 1 personne suite à un cas de foudre le 11 août 2026 dans les villages de Kowaguel et Alachigani au nord de Boutti dans la commune de Goudoumaria, région de Diffa ;
- La mortalité de 47 têtes de petits ruminants appartenant à 9 ménages dans les localités de Boundou belli et Boundou Bougagé de la commune de Bermo, région de Maradi ;
- La mortalité de 18 camelins suite à une foudre à Maikonongna à 75 km de Tesker, région de Zinder ;
- La mortalité par noyade de 126 ovins à Manassa à 90km de Tesker, 135 ovins et 28 caprins à Aldjanari à 80km de Tesker dans la région de Zinder.
- des attaques de sautériaux sur le pâturage au niveau de l'enclave de Sandiré dans le département de Balleyara.

2.6. MISE EN VALEUR DES AMÉNAGEMENTS HYDRO AGRICOLES (AHA)

AHA DE LA RÉGION DE NIAMEY (figures 16 & 17).

Le mois d'août 2026 a été marqué par la poursuite et l'intensification des opérations de mise en valeur de la campagne rizicole de saison humide (SH 2026), notamment le suivi du repiquage, de la reprise et du développement végétatif des cultures, ainsi que l'approvisionnement en fertilisants et l'accompagnement technique des exploitants.

Sur une superficie prévisionnelle de 3 648,97 ha, 3 603,50 ha ont été effectivement repiqués, soit un taux de réalisation de 98,95 %, pour un reliquat de 45,47 ha. Seize (16) des vingt (20) AHA suivis ont atteint 100 % de réalisation. Les principaux écarts concernent Lata (29,52 ha non repiqués), ainsi que Goudel, Lamordé et N'Dounga 3. Le niveau global de réalisation traduit une bonne mobilisation des producteurs et des dispositifs d'encadrement. Une attention particulière reste toutefois requise sur les superficies résiduelles et sur la fiabilisation des données statistiques, notamment l'écart de 7,35 ha constaté entre les superficies prévisionnelles de repiquage et celles déclarées pour le labour-planage.

L'approvisionnement en fertilisants est globalement satisfaisant. Pour le NPK, sur un besoin de 928,65 t, 928 t ont été mobilisées, soit 99,93 % de couverture. Pour l'urée, les données disponibles indiquent 723 t réalisées pour 714,95 t de besoins, correspondant à une couverture globale supérieure au besoin exprimé. Des déficits persistent cependant à Goudel et Lamordé, sans réalisation enregistrée, ainsi qu'à Saadia Aval, Say I et Say II pour le NPK. Le cas de N'Dounga 2, présentant une réception de NPK supérieure au besoin prévisionnel, nécessite une vérification de la traçabilité des stocks et de leur répartition entre AHA.

Sur le plan agronomique, les cultures présentent une bonne installation générale, avec un taux moyen de reprise de 97,5 %. La majorité des AHA affichent une reprise de 100 %, tandis que des niveaux plus faibles sont observés à Goudel et Lata (80 %) et Tiaguiriré (90 %). Le développement végétatif se situe principalement entre les phases de tallage et de montaison, avec respectivement environ 39 % et 38,9 % des superficies concernées. Cette évolution demeure cohérente avec les dates de repiquage, mais présente une certaine hétérogénéité entre AHA.

En conclusion, la campagne SH 2026 dans les AHA de la région de Niamey présente un niveau d'exécution globalement très satisfaisant, caractérisé par un repiquage quasi intégral, une couverture presque complète des besoins en fertilisants et une bonne reprise des plants.



Figures 16 & 17: AHA Niamey

2.7. ÉVOLUTION DES PRIX SUR LES MARCHÉS

Sur le plan national les niveaux des prix des denrées alimentaires suivies connaissent une baisse comparée à la même période de 2025. Les variations les plus significatives constatées sont -20 % pour le maïs, -16 % pour le sorgho et -10 % pour le mil (fig.16).




Figure 18: Prix moyen en FCFA des produits à la 3ème décade du mois d'aout 2026 comparé à celle de la même période de 2025

IV. SYNTHÈSE

La situation pluviométrique du moi d'août 2026 a été caractérisée par de pluies faibles à modérées voire fortes par endroits sur l'ensemble de la bande agropastorale.

Le développement végétatif des cultures connaît une amélioration progressive à la faveur des précipitations enregistrées au cours de ce mois d'août.

En dépit des infestations enregistrés, la situation phytosanitaire est sous contrôle.

La situation acridienne reste actuellement calme malgré les conditions pluviométriques et écologiques favorables à la reproduction du Criquet pèlerin, avec seulement la présence d'individus isolés matures dans le Tamesna.

La situation pastorale est critique dans les zones non encore arrosées ou faiblement arrosées présentant des sols complètement nus. Toutefois, l'embonpoint des animaux est globalement passable.

Les niveaux des prix des produits restent relativement bas par rapport à l'année passée.

V. PERSPECTIVES

- Des pluies faibles à modérées sont attendues selon les dernières mises à jour des prévisions climatiques saisonnières ;
- Les cultures pourraient boucler leur cycle végétatif ;
- Les infestations des ravageurs des cultures pourraient persister voire s'intensifier du fait des conditions écologiques de plus en plus favorables ;
- La reproduction estivale se poursuivra au Niger et on pourrait s'attendre dans les semaines à venir à une augmentation d'effectifs acridiens ;
- La situation pastorale pourrait s'améliorer au vu des prévisions climatiques saisonnières ;
- Les prix des céréales pourraient connaître une stabilité voire une baisse avec les prochaines récoltes.



VI. AVIS ET CONSEILS

- Anticiper la pratique des cultures irriguées au niveau des zones sans semis ou en retard ;
- Poursuivre et intensifier les opérations de surveillance et de prospection des cultures pour éviter l'apparition des nouveaux foyers d'infestations ;
- Poursuivre et intensifier les opérations de prospection dans les zones de grégarisation du criquet pèlerin ;
- Poursuivre le suivi rapproché des AHA, notamment ceux présentant des retards ou des taux de reprise plus faibles, tout en veillant à une bonne gestion de l'eau et à la disponibilité des fertilisants.
- Renforcer la surveillance phytosanitaire et la fiabilisation des données afin d'assurer un bon suivi du développement des cultures et d'anticiper les éventuelles difficultés.
- Procéder au déstockage stratégique du cheptel et mettre en place à temps les aliments pour bétail dans les zones à risques.





Ce bulletin est produit par le groupe thématique **Climat Agriculture & Sécurité Alimentaire** du Cadre National pour les Services Climatiques du Niger avec l'appui du **PAM** sous la coordination de la **DNM**.

Ont participé à l'élaboration de ce bulletin

- **CNLA** | Centre National de Lutte Antiacridien
- **DGA** | Direction Générale de l'Agriculture
- **DGDP/PIA** | Direction Générale du Développement Pastoral, de la Production et des Industries Animales
- **DGGR** | Direction Générale de Génie Rural
- **DGPV** | Direction Générale de la Protection des Végétaux
- **DNM** | Direction Nationale de la Météorologie
- **DNPGCA** | Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires
- **DS/MAG/EL** | Direction des Statistiques, Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
- **FEWSNET** | Famine Early Warning Systems Network
- **IGS/MAG/EL** | Inspection Générale des Services/Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
- **INRAN** | Institut National de la Recherche Agronomique du Niger
- **ONAHA** | Office National des Aménagements Hydroagricoles



Contacts

Dr Adamou Aissatou Sitta

Directrice de la Météorologie Nationale

☎ Tél. : +227 20 73 21 60

✉ E-mail : asita_s@yahoo.fr / dnm@intnet.ne

Mr Oumara Moussa

Direction Générale d'Agriculture

☎ Tél. : +227 88 16 54 07

✉ E-mail : oumaramoussa800@gmail.com



Cellule de Communication DNM

M. SAMAÏLA ALSO ISSA

☎ Tél./WhatsApp : +227 96 53 50 68

✉ E-mail : samailalsoi@gmail.com

M. Maï Wandara Zakaria

☎ Tél./WhatsApp : +227 96 06 86 25

✉ E-mail : zakariawandara67@gmail.com



VOTRE AVIS COMPTE

Vos impressions, idées et suggestions sont essentielles pour améliorer nos bulletins et mieux répondre à vos besoins



PARTAGEZ

vos impressions sur le contenu du bulletin



PROPOSEZ

des idées d'amélioration



INFORMEZ-NOUS

de vos besoins en information agro-climatiques



**RESTEZ INFORMÉS À TRAVERS NOS
CANAUX OFFICIELS DE COMMUNICATION.**



Site web :
www.niger-meteo.ne



Scannez pour rejoindre
notre canal WhatsApp